

فشار خون بالا

پروتکل اورژانسهای مامایی

ارزیابی

سؤال کنید:

سر درد، تاری دید، درد اپی گاستر
سابقه بیماری کلیوی، قلبی،
فشارخون بالا، تهوع و استفراغ
شدید

تعیین کنید:

میزان BP ، سن بارداری، میزان
آلبومین ادرار، وضعیت وزن گیری

فشارخون کمتر از 160/110 میلی جیوه همراه
با پروتئینوری کم یا +2، ادم ژائریلزه، بدون سردر
، تاری دید، درد اپی گاستر

اقدام

- فوراً رگ بگیریید
- تزریق سرم قندی یا رینگر حداکث 32 قطره در دقیقه
- مشاوره زنان

فشارخون دیاستولیک مساوی یا بالاتر از 110
میلی متر جیوه همراه با پروتئوزی +2، ادم
، سردر، تاری دید، درد اپی گاستر

اقدام

- فوراً رگ بگیریید
- دادن اکسیژن به میزان 6 تا 8 لیتر در دقیقه با ماسک
- تزریق هیدرولازین
- شروع سولفات منیزیم
- وجود ست احیاء
- مشاوره اورژانسی زنان

اقدام

نیمه اول بارداری

لکه بینی، درد شکم
تندرستی، ریباند شکم

EP(حاملگی خارج رحم)

- رگ بگیری
- تزریق سرم به بیمار
- ارسال BhCG
- رزرو خون - مشاوره اورژانسی زنان

ارزیابی

خونریزی درحد قاعدگی
یا بیشتر
درد شکم مشابه درد
قاعدگی

سقط

- رگ بگیری
- تزریق سرم - رزرو خون
- مشاوره اروژانسی زنان

سؤال کنید:
میزان خونریزی، تهوع، استفراغ
درد شکم

تعیین کنید:
سن بارداری، تعداد ضربان قلبی
جنین



نیمه دوم بارداری

دردشکم، افزایش اندازه و سفتی
پیشرونده تندرست رحم

جداشدن زودرس جفت

- رگ بگیری
- دادن اکسیژن
- عدم معاینه واژینال
- خوابانیدن مادر به پهلو چپ
- مشاوره اورژانسی زنان

ترشحات خونی

نمایش خونی

انقباض رحم



ارزیابی

اختلال هوشیاری
در حال تشنج یا قبلاً تشنج کرده



اقدام

- اطمینان از باز بودن راه هوایی و گذاشتن ایروی
- دادن اکسیژن به میزان 6-8 لیتر در دقیقه
- ساکشن ترشحات حلق
- عدم تجویز مواد خوراکی به بیمار
- خواباندن مادر به پهلو چپ
- باز کردن رگ، شروع سرم تراپی
- تزریق سرم قندی، نالوکسان

اکلامپسی

- در صورت شک به اکلامپسی - درمان خاص بیماری

ارزیابی

شوک



اقدام

ناشی از خونریزی



ناشی از عفونت



اقدام شوک ناشی از خونریزی

+

شروع آنتی بیوتیک

واحد آموزش بیمارستان آیت ا... طالقانی

- درخواست کمک

- اطمینان از باز بودن راه هوایی

- گرم نگه داشتن بیمار - قراردادن پاها بالاتراز سطح بدن

- دادن اکسیژن - باز کردن دو رگ و شروع سرم

- سوند گذاری مثانه و کنترل I/O

- رزرو خون



ارزیابی

تعیین کنید:

سن بارداری - درجه حرارت

اقدام

تب

لمس توده نبض دار واژن

وجود انقباضات رحم

نبود انقباضات رحم زیر 37 هفته

وجود یا عدم وجود انقباض در 37 هفته
هفتگی

آمینونیت

- رگ بگیریید سرم قندی-نمکی یارینگر
- دادن اکسیژن 6-8 لیتر در دقیقه
- تزریق وریدی آنتی بیوتیک (آمپی سیلین 2gr)

پرولاپس بندناف

- رگ بگیریید اکسیژن دهید.
- قرار دادن مادر در وضعیت سجده
- سونداژ مثانه
- مشاوره اورژانسی زنان

زایمان زودرس

زایمان زودرس

ارجاع به زایشگاه جهت زایمان

تنگی نفس ناگهانی، درد قفسه سینه، سیانوز

بیقراری

تاکی کاردی

تاکی پنه

اقدام

- بازنگه داشتن رگ و تزریق رینگر

- کنترل علائم حیاتی هر 15 دقیقه

- مشاوره اورژانسی زنان

ارزیابی

سؤال کنید:

سرفه، تنگی نفس، ورم اندام ها، سابقه

آسم، درد قفسه سینه

تعیین کنید:

علائم حیاتی تعداد ضربان قلب، میزان

هموگلوبین، بیقراری، سیانوز

ارتوپنه، خروج کف از دهان، رال ریوی

سیانوز

بیقراری

تاکی کاردی

تاکی پنه

اقدام

ادم حاد ریه

- بازنگه داشتن رگ

- دادن اکسیژن 6-8 لیتر در دقیقه

- قراردادن بیمار در وضعیت نیمه نشسته

- تزریق وریدی 10 تا 20 میلی گرم لازکس

- تزریق مرفین

- مشاوره اورژانس داخلی