

## تریاز بیمار

آیا بیمار در حال مرگ است؟

- ایست قلبی
- ایست تنفسی
- زجر تنفسی شدید
- اشباع اکسیژن کمتر از 90%
- بیمار با ترومای متعدد بدون پاسخ
- مسمومیت با تعداد تنفس 6
- بچه شل
- آنافیلاکسی

سطح 1

سطح 2

آیا بیمار نباید منتظر بماند؟

- ✓ بیمار با درد قفسه سینه مشکوک به بیماری حاد کرونر که پایدار است
- ✓ کارگر بخش اورژانس که نیدل استیک شده
- ✓ خانم جوان مشکوک به حاملگی خارج رحمی با علائم حیاتی پایدار
- ✓ علائم سکته مغزی که در سطح یک نباشد
- ✓ بیماری که اقدام به خودکشی یا دیگر کشتی کرده
- ✓ بیمار تحت شیمی درمانی که تب کرده
- بیمار با افت عملکرد مغزی (گیج، خواب آلود، غیرهوشیار)



- BVM ventilation
- Intubation
- Surgical airway
- Emergent CPAP
- Emergent BiPAP

- Defibrillation
- Emergent cardioversion
- External pacing

- Chest needle decompression
- Pericardiocentesis
- Open thoracotomy
- Intraosseous access

چند نمونه از

اقدامات نجات دهنده حیات

بیماران سطح 2  
احتیاج به بررسی  
سریع علائم حیاتی  
و رسیدگی سریع  
دارند



چه تعداد تسهیلات برای رسیدگی  
به بیمار تا زمان تعیین تکلیف مورد  
نیاز است؟

بیشتر

سطح 3

یک

سطح 4

هیچ

سطح 5

گروه حاکمیت بالینی بیمارستان آیت ... طالقانی آبادان